

YOSHIDA

知覚過敏抑制材料

フォース デンティン

混ぜても 使えちゃう

光照射不要

フォース デンティンキャンペーン

9/22 [月] - 12/19 [金]

治療後すぐ
飲食 OK

塗布前の
歯面乾燥
不要

象牙質知覚過敏症 / マイクロクラック / 生活歯の支台歯形成後の歯面 / ホワイトニング後の知覚過敏
スケーリング、スケーリング・ルートプレーニングの前後 / 露出歯根 等


フォースデンティンキャンペーン価格

40mL(20mL×2)

円

10mL(5 mL×2)

円




使用方法

※症状の程度により、繰り返しの塗布を推奨しています。


NEW!!

混和塗布する場合


① A液・B液を
同量ずつ混ぜる



② 歯面清掃後の患部に
こすり塗りする



③ 綿球などで拭き取り、
または洗浄する



混和塗布時



基本使用方法



ラバーカップ使用時

基本の
使用方法
(個別塗布)

① 歯面清掃後の患部に
A液をこすり塗り

② 綿球などで
A液を拭き取りする

③ B液を患部に
塗布する


④ 1分静置後に
拭き取り、または洗浄する

☒ ラバーカップで塗布 ☒ 治療後すぐ飲食 ☒ こすり塗り


☒ 光照射不要 ☒ 塗布前の歯面乾燥不要

象牙細管の封鎖性と耐久性

微細な炭酸カルシウムが象牙細管内奥深くで石灰化し、歯の主成分と同じリン酸カルシウムが形成・膨張するためブラッシングやうがいでも取れにくいことが期待できます。また、石灰化に有利な弱アルカリ性であるため歯を溶かさない製品となっています。




※象牙質断面図イメージ



象牙細管断面図



象牙細管の奥まで入り込み、
象牙質との境目がわかりにくい
ほど緊密に封鎖します。

※塗布・写真撮影：大阪歯科大学口腔病理学講座
※牛歯 / 5,000 倍 SEM 画像



ブラッシングやうがい、
スケーリングでも取れにくい

〈測定条件〉牛歯を使用した実験データ
※臨床で使用する際は、経過日数や口腔内の
状況によって個人差が生じます。
(塗布・写真撮影：大阪歯科大学口腔病理学講座)



Point

超音波洗浄後



※牛歯 / ブラッシング 20 回・水洗 30 秒
(ブラッシングは 1 往復のストロークで 1 回とし、
水洗時の水温は 37 度を条件)

※超音波洗浄 2 分間


生体適合性

生体適合性があるという論文が発表されました。


フォース デンティンを添加した培地で
歯髄や歯周組織の細胞の培養を 14 日間の培養を行い、
生 / 死細胞染色を行ったところ、
生細胞 (緑色) のみが観察されました。

引用文献：Sealing Property of Dentin Tubules by A New Hypersensitivity
Control Material and Its Effect on Human Cultured Cells


Point
お口に優しい



(ヒト乳歯由来歯髄線維芽細胞)



(ヒト歯周靱帯線維芽細胞)



(ヒト骨芽細胞)

コードNo.	商品名	注文数
445089	フォースデンティン 40mL (20mL×2)	
445096	フォースデンティン 10mL (5mL×2)	

フォースデンティンキャンペーンご注文書

一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料 (歯科用シーリング・コーティング材料)
販売名：フォース デンティン 認証番号：305AGBZX00005000 (管理)
製造販売元：株式会社メディボ TEL：06-6673-5756

貴歯科医院名・芳名

お取引歯科ディーラー名

ご住所

TEL () FAX ()

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

〈販売元〉株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ：0800-170-5541

