

ウィル・ステラVジェル

速乾性アルコールジェル 第3類医薬品



ノータッチ式ディスペンサー

速乾性アルコールジェル専用ディスペンサー

ノータッチで手指衛生

のびが良く、
さらっと
べたつかない
保湿成分
配合※



※グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン

ノンエンベロープウイルスを含む、幅広い微生物に効果的

ウィル・ステラVジェルの各種ウイルスに対する不活化効果 サラヤ(株)バイオケミカル研究所試験結果

	ウイルス	タンパク質負荷	作用時間	減少率(%)
エンベロープなし	ポリオウイルス1型* Poliovirus Type 1	あり	15秒	> 99.99
	アデノウイルス5型* Adenovirus Type 5 / Adenoid 75	なし	15秒	99.96
			30秒	> 99.99
		あり	15秒	99.25
		30秒	> 99.99	
	パポウイルスSV 40* Papovavirus SV 40	あり	15秒	> 99.99
エンベロープあり	ネコカリシウイルス F-9**2 (ノロウイルス代替) Feline calicivirus F-9	あり	15秒	> 99.99
	マウスノロウイルス S7**2 (ノロウイルス代替) Murine norovirus S7	あり	15秒	> 99.99
	ワクシニアウイルス* Vaccinia virus, strain Elstree	あり	15秒	> 99.99
	ウシウイルス性下痢ウイルス**3 (HCV代替) Bovine viral diarrhea virus 1 (BVDV)	あり	15秒	> 99.99
	インフルエンザウイルスA (H1N1) 型 Influenzavirus Type A (H1N1)	あり	15秒	> 99.99
	ヘルペスウイルス1型 Herpes simplex Type1	あり	15秒	> 99.99

*: DVV & RKIガイドラインにおける「Virucidal activity」の指標ウイルス
 **2 ネコカリシウイルス、マウスノロウイルス、ノロウイルスの代替ウイルス ※3 ウシウイルス性下痢ウイルス、HCVの代替ウイルス
 DVV & RKIガイドラインではそれぞれの指標ウイルスに対して、ウイルス感染価で4.0 Log10以上の減少(感染価の減少率:99.99%以上)が認められた場合、その製剤はウイルスに対して有効であると判定されます。



ジェル状

速乾性アルコールジェル 第3類医薬品

ウィル・ステラVジェル ディスペンサー用600mL 6個入

内容量●1個=600mL
 包装・希望医院価格●1函:6個=¥12,000
 ※ご使用にはノータッチ式ディスペンサーが必要です。



速乾性アルコールジェル専用ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサー UD-9600A セット

サイズ●本体:W142×D101×H248mm
 トレーD型:W92×D110×H131mm
 包装・希望医院価格●1函:本体、取付板、トレーD型=¥10,100
 ※単2アルカリ乾電池4本および壁面取り付け用タッピングねじ(呼び4×25)3本は付属していません。
 ※ウィル・ステラVジェルは別売です。

オプション



掲示スペース
(220×150mm)
 手指消毒啓発パネル
手指消毒
 掲示スペースには、
 付属の手指消毒啓
 発パネルを貼り付け
 ることができます。



ノータッチ式ディスペンサー用 スタンド

種類●IS-9000-PHU
 サイズ●W350×D350×H1,310~1,700mm
 包装・希望医院価格●1函:本体、手指消毒啓
 発パネル、スタンド取り付け用ねじ=¥9,000
 ※ウィル・ステラVジェルとノータッチ式ディスペンサー
 は別売です。
 ※組み立て品です。

ノータッチ式ディスペンサー用 据置台

サイズ●W160×D140×H450mm
 包装・希望医院価格●1函:本体、取付板、据置台取り
 付け用ねじ=¥6,300
 ※ウィル・ステラVジェルとノータッチ式ディスペンサー
 は別売です。
 ※組み立て品です。

商品名	ウィルステラVジェル	薬効分類番号	2615	製造販売元	サラヤ株式会社				
使用上の注意	してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと (1) 損傷のある皮ふ。 (2) 目の周囲、粘膜等。								
	相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table>		関係部位	症状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ			
関係部位	症状								
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ								
効能 又は 効果	手指・皮ふの消毒								
用法 及び 用量	適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。								
用法 及び 用量 に関連する注意	(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 (3) 外用にのみ使用すること。 (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。								
成分 及び 分量	ウィル・ステラVジェルは、有効成分としてエタノール (C ₂ H ₆ O) 76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸を含有する。								
保管 及び 取扱い上の 注意	(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。 (5) 火気に近づけないこと。 (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。 (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。 (8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。								
包 装	600mL								

本製品は一般用医薬品(第3類医薬品)です。

●ご使用の際は、ラベル又は箱記載の説明文書をよくお読みください。

※掲載情報は、2021年1月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **サラヤ株式会社**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪府大阪市東住吉区湯里2-2-8

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支 店
 ●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
 営業所
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286

iPhoneも Androidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRコードでOK!

推奨OSバージョンはiOS:11.0以上、Android:8.0以上です。

