

SUNSTAR

医療機関向

歯周病菌とたたかう



歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

サンスターメディカル軟膏 ペリオ サンスターメディカルペースト ペリオ

第3類医薬品



指塗り



ブラッシング



【効能・効果】歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・腫れ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

歯肉の腫れ・出血・痛み'に効く 歯みがき後に使う医薬品

歯周病の治療・予後管理には、専門家の定期的な管理 × ご家庭で行うセルフケアの徹底が重要です

【効能・効果】 歯周病（歯肉炎・歯周炎）に伴う諸症状（歯肉の出血・発赤・腫れ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭）の緩和、口内炎

このような患者さんに

- ◆歯周病の初期治療中で、出血・発赤・腫れ・痛みがある方
- ◆歯周病安定期治療(SPT)中で、プロービング時などに出血が認められる方
- ◆歯肉の炎症が慢性化し頻繁に通院している方
- ◆口内炎のある方

このような時に
お使いください

- ◆歯周病の急性炎症期における一次処置
- ◆歯周病の治療および予後管理の補助
- ◆チェアサイドでの処置の一環としてお使い頂く事もできます

歯周病
(歯肉炎・歯周炎)
のとき

ハグキの腫れや痛みで
ブラッシングが困難な
患者さん

指で 軟膏タイプ


指につけて
歯肉に塗りこむ

※ハブラシで患部にうまく塗布できない方や、口内炎での利用は軟膏タイプ(指塗り)がおすすめです。

ブラッシングで
患部の痛みを感じない
患者さん

ハブラシで ペーストタイプ

ハブラシにつけて
歯肉をマッサージ
するように塗布する



抗炎症作用
GK2
0.4%

殺菌作用
CPC
0.3%

歯肉や口腔粘膜の
組織修復作用
パンテノール
0.4%

ハグキの腫れをぶり返した方に
3つの作用で歯周病諸症状を緩和

GK2※1

サンスター内最大濃度の
抗炎症剤GK2を配合

高濃度GK2が歯周病による歯肉の炎症を効果的に抑えます。

炎症物質の発生を抑制

※1 グリチルリチン酸二カリウム

CPC※2

サンスター内最大濃度の
殺菌剤CPCを配合

0.3%濃度の殺菌剤CPCが効果的に歯周病菌を殺菌。

CPCは、歯と歯肉に滞留し、歯周病菌の付着を防ぐ力も!

歯と歯肉の表面は、マイナスに帯電しており、プラスに帯電しているCPCは、歯と歯肉の表面に滞留して、歯周病菌の増殖を抑えたり、菌が付着するのを防いだりします。

※2 セチルピリジニウム塩化物水和物

パンテノール

組織修復作用を持つパンテノールを配合。歯肉や口腔粘膜の細胞増殖を促進し、歯肉や口腔粘膜の修復を助けます。

パンテノールの創傷面積縮小効果

日数	パンテノール 0.4%水溶液	水
0日後	0	0
1日後	20	10
2日後	40	20

ハムスター頬粘膜の創傷(口内炎)に試験液を1日2回塗布し、創傷面積を測定

創傷面積縮小率(%) = $\frac{\text{創傷作成時の創傷面積(mm}^2\text{)} - \text{各測定時点での創傷面積(mm}^2\text{)}}{\text{創傷作成時の創傷面積(mm}^2\text{)}} \times 100$

出典：サンスター社内資料
(試験委託先：公益財団法人食品農薬医薬品安全性評価センター)

本品は通常のプラークコントロールを正しく行ったうえ、補助的にお使いください。



販売名: **サンスターメディカル軟膏 ペリオ** 第3類医薬品

容量	販売単位	希望患者価格(税込/本)
10g	1箱(8本入)・1ケース(20箱入)	1,298円

【使い方】

指で 1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指につけて歯肉にやさしく塗りこんでください。洗い流す必要はありません

歯周病

清潔にした指に適量(約0.3g)をのせます

患部にやさしく塗りこんでください

口内炎 1日2~4回、適量を患部に塗ってください。

用法・用量に関連する注意

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)歯科用にも使用すること。

【成分・分量】(1g中)

成分	含量	作用
グリチルリチン酸二カリウム	4mg	抗炎症作用
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	殺菌作用
パンテノール	4mg	組織修復作用

添加物として、グリ化炭化水素、マクロゴール、ヒプロメロース、ポビドン、ヒマシ油、アンモニオアルキルメタクリレートコポリマー、メタケイ酸アルミン酸Mg、ℓ-メントール、香料、黄色4号(タートラジン)を含む。

使用上の注意

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

※ご使用に際しては、箱の中面又は製品に添付の説明文もご確認ください。

製品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。



販売名: **サンスターメディカルペースト ペリオ** 第3類医薬品

容量	販売単位	希望患者価格(税込/本)
25g	1箱(10本入)・1ケース(10箱入)	1,650円

【使い方】

ハブラシで 1日2回(朝・晩)、適量(約0.3g)をハブラシにつけて、歯肉をマッサージするように塗布してください。洗い流す必要はありません

歯周病

乾いたハブラシに適量(約0.3g)をつけます

歯肉をマッサージするように塗布してください

口内炎 1日2~4回、適量を患部に塗ってください。

【成分・分量】(1g中)

成分	含量	作用
グリチルリチン酸二カリウム	4mg	抗炎症作用
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	殺菌作用
パンテノール	4mg	組織修復作用

添加物として、グリセリン、プロピレングリコール、セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、シクロデキストリン、酸化チタン、サッカリンNa、リン酸水素Na、ハッカ油、香料、ℓ-メントール、ウイキョウ油、エタノールを含む。

使用上の注意

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号

医薬品についてのお問い合わせ
医薬品インフォメーションセンター

TEL 072-682-4815 受付時間/月~金9:00~17:00
(土・日・祝日は休業いたします)

Club Sunstar Pro

サンスターと医療従事者の声でつくる会員サイト

商品情報はClub Sunstar Proからもご覧いただけます。

